

El Consell de Formentera, a través del área de Agricultura, recuerda que la poda de especies sensibles al picudo rojo, es decir palmeras, se recomienda realizarla en los meses de enero y febrero, dado que en los últimos años la temperatura media más baja en Formentera se da en estos meses, evitando la proliferación del picudo.

En este sentido, el conseller de Medio Rural, Josep Marí, ha agradecido a la población la colaboración que ha realizado en los últimos años. En 2013 se produjo la primera destrucción de palmeras debido al picudo rojo en nuestra isla, en 2015, año de máxima prevalencia se tuvieron que destruir ciento diecisiete palmeras afectadas, "desde entonces ha habido una tendencia a la baja , en 2022 sólo se han destruido cuatro palmeras lo que nos confirma la evolución a la baja de la plaga", según ha declarado el conseller.

Autorización de Agricultura

Se aconseja que las podas de palmera se efectúen previa autorización del área de Agricultura del Consell Insular de Formentera, situada en el Centro Antoni Tur "Gabrielet" y que tiene horario de atención de 9 a 14 h de lunes a viernes, la autorización también se puede tramitar en el OVAC (Oficina de Atención Ciudadana). El objetivo de esta medida es la protección de los ejemplares de palmera podados y la correcta gestión de los residuos generados en la planta de transferencia de la isla (la autorización permite subir los residuos a la planta de transferencia, de forma gratuita).

Cabe destacar que para las podas de plantas sensibles deben seguirse las siguientes indicaciones: podar preferentemente sólo las hojas secas. En caso de que sea necesario cortar las hojas verdes, se deben minimizar las heridas y aplicar a la cicatriz mástico de poda o un tratamiento fitosanitario. Los cortes deben ser limpios, que no provoquen desgarros. Los estipes o troncos de las plantas sensibles no deben cepillarse. No debe utilizarse el afeitado o el perfilado como técnica de poda con motivos ornamentales, sino únicamente en los casos que esté justificado y siempre seguido inmediatamente de un tratamiento fitosanitario. En caso de que durante las tareas de poda se detecte la presencia del picudo rojo se tiene que informar al área de Agricultura del Consell Insular de Formentera para continuar con el protocolo oficial de actuación.

El picudo rojo, *Rhynchophorus ferrugineus*, el escarabajo plaga que ataca a las palmeras, reduce e, incluso, detiene su actividad biológica cuando la temperatura es más baja.

12 de enero de 2023

Área de Comunicación

Consell de Formentera